AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-9-65 404441

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION MENSUELLE

ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES
(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.
C. C. P. : LYON 9.430-12 TÉLÉPHONE (78) 37-20-56

ABONNEMENT ANNUEL 15 F

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région Bulletin N° 60 de Septembre 1965

17 Septembre 1965

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

TAVELURES SUR POIRES - Sur variétés tardives à récolter après le 5 octobre et dans la situation actuelle, il est recommandé d'appliquer un dernier traitement fongicide dans les jours prochains.
Sur pommes, un tel traitement ne s'impose que dans les plantations où des fruits portent déjà des taches.

TORDEUSE ORIENTALE SUR POIRES ET POMMES ET EN PEPINIERES - Avec le relèvement de la température, on doit s'attendre à un regain d'activité de ce ravageur. Un dernier traitement devra être appliqué avant le 25 septembre dans la zone de culture du pêcher seulement.

ANTHONOME d'AUTOMNE SUR POIRIER - Dans les rares plantations où des bourgeons desséchés ont été observés au printemps, on appliquera une 1ère fois avant le 25 septembre un traitement approprié qui sera renouvelé vers le 10 octobre.

Les trois traitements ci-dessus pourront éventuellement être combinés moyennant l'utilisation comme insecticide du D.D.T. à 150gr/hl de matière active, le choix du fongicide restant libre.

POU DE SAN JOSE (zones contaminée et de protection)
Nous rappelons que le traitement contre la 2ème génération devra être renouvelé avant le 25 septembre. La 1ère application ayant rencontré de très mauvaises conditions météorologiques, ce renouvellement aura un caractère primordial.

INFORMATIONS

MOUCHE MEDITERRANEENNE DES FRUITS - En raison des conditions climatiques hautement défavorables à cet insecte du 22 août au 13 septembre, aucune attaque importante n'est à craindre pour l'instant. Les cas de pourritures récemment constatées sont dûes essentiellement à la très forte pluviosité de la quinzaine écoulée.

CULTURES DIVERSES

INFORMATIONS

MILDIOU DE LA TOMATE - Les traitements fongicides devront être repris ou poursuivis d'urgence.

PARASITES DES CULTURES LEGUMIERES - Actuellement, la protection devra être maintenue contre la teigne du poireau, la septoriose du cèleri et la mouche de la carotte.

P 420

CLIMATOLOGIE

L'ETE 1965 - Les caractères généraux de la saison écoulée ressortent du tableau ci-dessous relatif à la Station de Lyon-Bron:

			période 1922-1964				
	1965	1964	Moyenne	Le meilleur	Année	Le pire	Année
Température moyenne	18.41	20.22	19.67	22.14	1950	17.73	1956
Hauteur d'eau	238.0	151.5	235.9	55.3	1949	408.7	1963
Nbre de jours de pluie	42	27	32	20	1923	47	1963
Insolation (en heures)	741	909	799	1019	1962	593	1930

Eté médiocre, très frais, modérément déficitaire en insolation. En fait, seul le mois de Juillet a cumulé tous les éléments défavorables: température très déficitaire (2°0 au-dessous de la moyenne), forte pluviosité (152mm pour une moyenne de 62mm) et insolation médiocre (232 heures au lieu de 285). L'excédent pluviométrique de juillet a été presque exactement compensé par les déficits d'août et surtout de juin. Si l'insolation a été très voisine de la moyenne en juin et en août, la température n'a été normale qu'en juin, le mois d'août ayant présenté encore un déficit thermique de 1°6.

La répartition des pluies est d'ailleurs assez variable dans l'ensemble de la région. Si juin a été presque partout déficitaire, juillet, fortement excédentaire dans la moitié nord de la région, a été normal ou déficitaire dans la moitié sud. Quant à août, il n'a été nettement déficitaire que des Monts du Forez au sud du Rhône et à la moyenne vallée du Rhône, il apparait ailleurs voisin de la normale.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
A.PITHIOUD

Le Contrôleur chargé des Avertissements agricoles
P.LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L.BOUYX